

Bilan météo de l'hiver 2025-2026



Retrouvez ci-contre le bilan météo de l'hiver (novembre à janvier) pour nos stations météo. L'écart à la moyenne trentennale est calculé lorsque les données sont disponibles pour la pluviométrie et la température.

Globalement, **l'hiver 2025-2026 semble plutôt humide et doux**, avec en moyenne près de 1°C d'excédent thermique sur les trois mois. Des épisodes cévenols ont amené des cumuls de pluie conséquents sur certaines stations ardéchoises.

À priori, les conditions météo humides actuelles devraient perdurer sur la première quinzaine de février

Fertilisation azotée de l'herbe

Le déclenchement de la fertilisation azotée de l'herbe (prairies et dérobées) en sortie d'hiver est classiquement piloté par le cumul de degrés-jours depuis le 1^{er} janvier. **Le redémarrage végétatif est suffisant pour valoriser les apports lorsque ce cumul atteint 200°C.**



À ce jour, aucune des stations météo du réseau n'atteint le seuil des 200°C. Les stations les plus précoces en vallée du Rhône devraient franchir cette valeur en fin de semaine. Pour les situations plus moyennes, les 200°C seront dépassés au cours de la 2^{ème} quinzaine du mois.

2 février
2026

Un apport sous quelle forme ?

L'apport d'azote n'est pas obligatoirement à faire sous forme d'engrais chimique. Pour rappel, les lisiers sont les effluents d'élevage qui ont la plus grande proportion d'azote minéral, c'est-à-dire la forme la plus rapidement assimilable par les plantes. Les fumiers et les composts présentent des teneurs plus faibles en azote minéral.



Adice
Service - Conseil - Expertise

Écart à la moyenne au cours
de l'hiver (nov-jan)

	Stations météo	Σ T°C depuis le 1 ^{er} janvier	Σ pluvio depuis le 1 ^{er} nov	Écart de la pluvio.	Écart de température
38	Bourgoin-Jallieu (358 m)	141	274	+ 61 mm	+ 1,0°C
	St-Étienne-St-Geoirs (384 m)	106	239	+ 13 mm	+ 0,6°C
	St-Laurent-du-Pont (410 m)	73	375	-	-
	Chatte (272 m)	123	211	- 21 mm	+ 0,8°C
	Roissard (746 m)	88	299	-	-
	Villard-de-Lans (1027 m)	53	362	+ 11 mm	+ 1,1°C
26	Chapelle-en-Vercors (879 m)	88	398	+ 32 mm	+ 1,2°C
	St-Christophe Laris (400 m)	135	248	- 2 mm	+ 1,1°C
	Valence-Chabeuil (163 m)	159	291	+ 66 mm	+ 1,0°C
	St-Sauveur-en-Diois (338 m)	150	281	-	-
07	Annonay (336 m)	148	201	- 7 mm	+ 1,3°C
	Aubenas-Lanas (265 m)	160	343	+ 32 mm	+ 0,5°C
	Colombier-le-Jeune (566 m)	132	375	+ 103 mm	+ 1,0°C
	Issanlas-Peyrebeille (1264 m)	33	459	+ 183 mm	+ 0,7°C
	St-Agrève (1014 m)	81	307	+ 28 mm	+ 0,5°C

À titre d'exemple, pour des apports en sortie d'hiver sur prairies ou dérobées :

- 30 m³ de lisier dosant à 3 kg d'azote/m³ équivaut à 40 unités d'azote chimique
- 30 tonnes de fumier dosant à 6 kg d'azote/tonne équivaut à 20 unités d'azote chimique
- Un apport de compost n'a pratiquement pas d'effet azote direct mais peut être intéressant pour son apport de phosphore ou d'humus



Afin de bien connaître la valeur de vos effluents, n'hésitez pas à demander une analyse à votre conseiller Adice.

Gestion du pâturage hivernal

Le pâturage de l'herbe d'hiver dans les prairies ou les couverts végétaux permet d'économiser des fourrages conservés et de réduire la distribution de concentrés. Cette technique est plutôt destinée à des animaux à besoins modérés comme des génisses de 2 ans. C'est aussi l'occasion d'achever le nettoyage des repousses d'automne afin de préparer la nouvelle saison d'herbe.



Le risque majeur reste la détérioration des parcelles par temps humide. Théoriquement, le pâturage doit se limiter aux parcelles portantes, avec un chargement inférieur à 0,8 UGB/ha (une grande génisse au maximum) accompagné d'un faible temps de séjour (une semaine au maximum).



Génisses croisées de 18 à 24 mois au pâturage sur les parcs des laitières au cours de l'hiver. La consommation des refus d'automne et de la petite pousse hivernale permet d'améliorer la qualité de la future herbe printanière par la disparition des vieilles feuilles et la plus grande proportion de trèfles (accès à la lumière).

En plus de ces critères essentiels, **il est primordial qu'il y ait aussi un minimum de stock d'herbe sur pied à consommer** (au moins 5 à 7 cm) et **de sortir le lot avant que la pâture ne soit trop rase** (4 cm au plus bas). Il faut noter que les pâtures « rasées » seront les dernières à repartir au printemps. Un temps de repos de 2 mois avant le pâturage de printemps est à respecter pour ne pas épuiser l'herbe. Par exemple, si les génisses sortent du paddock le 15 février, le pâturage y reprendra le 15 avril et ces parcelles se trouveront alors en fin du premier cycle de pâture.

Préparer son pâturage du printemps

L'hiver est encore bien présent, mais c'est dès à présent qu'il faut mettre en place un plan prévisionnel de pâturage afin de se questionner sur le mode opératoire à venir :

- Quelles surfaces seront pâturées et quelles surfaces seront fauchées ?
- Combien de lots vont pâturer au printemps, quels effectifs, avec quel chargement ?
- Quel découpage de mes parcelles et combien de jours de présence consécutif sur la même parcelle ?
- Accès (entrée – sorties) aux paddocks, positionnement de l'abreuvement, etc.



N'hésitez pas à solliciter votre conseiller Adice pour vous aider dans votre planification.

2 février
2026



Adice
Service - Conseil - Expertise

Bulletin rédigé par Adice Conseil Élevage
avec le soutien financier des Crédits
Agricoles Sud-Rhône-Alpes et Centre-Est



Adice
Service - Conseil - Expertise

Vos Conseillers d'élevage Adice



BOVIN

Pierre GONIN - Nord Isère

06 30 63 23 40

Maëline CERDAN - St Marcellin

06 22 73 85 11

Laurine DELORT - Chartreuse / Valdaine

06 71 00 37 07

Chloé GRILLOT - Terres Froides Ouest

06 71 00 36 98

Clément DIVO - Terres Froides Est

06 71 00 37 10

Marie-Lou LORENZATO - Vercors / Royans

06 25 41 19 58

Yannick BLANC - Nord Drôme

06 25 41 19 70

Odile SEIVE - Nord Ardèche

06 62 42 06 00

Katleen PETIT - Vallée du Rhône

06 62 42 08 16

Jérémy CRESPI - Plateaux Ardéchois

06 26 36 41 28

Philippe CHABANAS - Vernoux

06 62 42 06 93

Margot ALLIX - Sud Isère

06 71 00 37 18



CAPRIN / OVIN

Benoit DESANLIS - Isère

06 30 63 23 19

Aude PASQUET - Nord Drôme / Vercors

06 76 91 90 99

Mathilde CHAZALET - Sud Drôme


06 25 41 19 74

Priscilia CROUZET - Nord Ardèche

06 62 42 06 44

Lucas CLAUZIER - Sud Ardèche

06 62 42 08 99



- 1 Bourgoin-Jallieu (358 m)
- 2 St-Étienne-St-Geoirs (384 m)
- 3 St-Laurent-du-Pont (410 m)
- 4 Chatte (272 m)
- 5 Roissard (746 m)
- 6 Villard-de-Lans (1027 m)

- 7 La Chapelle-en-Vercors (879 m)
- 8 St-Christophe et le Laris (400 m)
- 9 Valence-Chabeuil (163 m)
- 10 St-Sauveur-en-Diois (338 m)
- 11 Annonay (336 m)

- 12 Colombier-le-Jeune (566 m)
- 13 St-Agrève (1014 m)
- 14 Issanlas (1264 m)
- 15 Aubenas-Lanas (265 m)

Stations météo