


16 mars
2026Somme de température depuis le 1^{er} février

	Stations météo	Σ T°C depuis le 1 ^{er} février	Σ pluvio depuis le 1 ^{er} janvier
38	Bourgoin-Jallieu (358 m)	419 (+156)	214 (+33)
	St-Étienne-St-Geoirs (384 m)	351 (+130)	210 (+30)
	St-Laurent-du-Pont (410 m)	315 (+118)	355 (+48)
	Chatte (272 m)	375 (+140)	209 (+49)
	Roissard (746 m)	305 (+116)	373 (+43)
	Villard-de-Lans (1027 m)	195 (+76)	407 (+42)
26	Chapelle-en-Vercors (879 m)	271 (+101)	392 (+51)
	St-Christophe - Laris (400 m)	371 (+140)	186 (+35)
	Valence - Chabeuil (145 m)	421 (+151)	154 (+30)
	St-Sauveur-en-Diois (338 m)	388 (+140)	223 (+50)
07	Annonay (336 m)	377 (+138)	124 (+14)
	Aubenas-Lanas (265 m)	404 (+145)	194 (+9)
	Colombier-le-Jeune (566 m)	366 (+136)	195 (+17)
	Issanlas - Peyrebeille (1264 m)	155 (+61)	268 (+36)
	St-Agrève (1014 m)	245 (+94)	190 (+19)

Entre parenthèses : évolution sur les 15 derniers jours

Bulletin rédigé par Adice Conseil Élevage
avec le soutien financier des Crédits
Agricoles Sud-Rhône-Alpes et Centre-Est



Toujours des conditions favorables



Après le petit passage hivernal de ces derniers jours, **les conditions météo vont revenir à des normales printanières**. Les gelées matinales devraient progressivement disparaître en plaine et s'atténuer en montagne. Le passage pluvieux a permis de rendre les apports de fertilisant disponibles pour la végétation. **Une situation favorable à la croissance de l'herbe !**

Stade des RGI précoces en plaine

En plaine précoce (Nord Isère, Vallée du Rhône, Grésivaudan), **les cultures dérobées de RGI continuent leur croissance à plein gaz !** On observe maintenant le stade « 2 nœuds - dernière feuille pointante » et la végétation atteint 40 à 50 cm de haut. En zone plus tardive, les RGI sont encore en début de montaison (épi 5-10 cm - 1^{er} nœud).



Le stade optimum de fauche est celui conciliant rendement et qualité. En général, **on retrouve cet équilibre juste avant l'épiaison, lorsque la dernière feuille du RGI est déployée** (stade 3 nœuds - dernière feuille étalée). Pour les zones précoces, ce stade devrait être atteint dans 10 à 15 jours (500-600°C cumulés).




RGI avec vesce velue et trèfle incarnat à 250 m d'altitude.

La dernière feuille du RGI commence à pointer. La fauche est à prévoir autour du 25 mars. Une avance d'environ 10-15 jours sur l'année dernière.

Réussir son ensilage d'herbe

La récolte fourragère n'est qu'une succession de pertes tout au long de la récolte, de la fauche à la distribution. L'objectif est de maîtriser toutes les étapes de récolte afin de réduire au maximum ces pertes.

Un taux élevé de sucres et un faible pouvoir tampon permettent une bonne fermentation du fourrage récolté (voir schéma ci-dessous). Un bon ensoleillement, une faible hygrométrie et surtout la présence du vent seront favorables à un bon pré-fanage, ce qui concentrera d'autant plus les sucres dans l'ensilage. En cas de conditions défavorables, l'ajout d'un conservateur biologique adapté peut grandement limiter les pertes par mauvaise fermentation.



Privilégiez une fauche à 8-10 cm de haut (hauteur d'une main) **à partir de la fin de matinée** afin de limiter la présence de la rosée dans le fourrage et de favoriser la rapidité du pré-fanage. La fauche à 8-10 cm favorise la ventilation sous l'andain et limite la présence de terre dans le fourrage (réduction du risque butyriques).

Tasser le fourrage au fur et mesure du chantier en couche de 20 cm maximum pour emprisonner le minimum d'oxygène dans l'ensilage. Il est également envisageable de gonfler les pneus pour augmenter la pression exercée sur le tas.

Déprimage en montagne

Face à une végétation en avance, des conditions de portance satisfaisantes pour un mois de mars et un prix du fioul qui s'emballe, **le déprimage est la solution idéale pour 2026.**

 Le déprimage, c'est pâturer tôt en sortie d'hiver des prairies destinées à la fauche en premier cycle. **Cette pratique améliore nettement la qualité de la future fauche** (relance du tallage, plus de légumineuses, consommation des pointes d'herbe gelée). En sortant tôt les animaux au pâturage, **le déprimage permet d'aller chercher de l'herbe à haute valeur alimentaire** (1,07 UF et 19,9 MAT analysé en moyenne sur la zone ADICE en 2025). Il faut bien entendu compléter en fourrage à l'auge, mais cela reste une très belle opportunité.



Premier tour de déprimage à Miribel-les-Échelles à 750 m d'altitude la semaine dernière

Cette pratique limite aussi le développement de certaines adventices indésirables (dicotylédones) et amène de la souplesse dans la gestion du pâturage : un décalage de pousse entre parcelles et un décalage de stade pour les futures parcelles de fauche.

À 500°C cumulés en prairies temporaires et permanentes (fertiles et précoces), **il est obligatoire d'avoir fini son premier tour et de cesser le déprimage.** Ce repère de 500° C est bien souvent le point de bascule pour envisager le pâturage jour et nuit.

16 mars 2026



Adice
Service - Conseil - Expertise

16 mars
2026

Les fermes du réseau de suivi de l'herbe



Les mesures de la pousse de l'herbe ont débuté sur notre réseau. Retrouvez ci-dessous les premières mesures de croissance de la semaine dernière

	Exploitation <i>Commune - altitude</i>	Situation au pâturage	Hauteur d'herbe	Croissance (kg de MS /ha/jour)
38	GAEC de Sully <i>Varacieux - 420 m</i>	1 ^{er} tour	6,2 cm	30 kg
	GAEC de la Mure <i>Biol - 500 m</i>	1 ^{er} tour	10,3 cm	34 kg
	Guillaume VESSARD <i>Miribel les Échelles - 740 m</i>	1 ^{er} tour	6 cm	20 kg
	EARL de la Grand Mèche <i>Lans en Vercors - 1030 m</i>	Sortie prévue sous 15 jours	/	/
	GAEC du Martinenc <i>Mens - 750 m</i>	Sortie prévue dans 10 jours	6 cm	/
26	Jean-Luc BERTHOIN <i>La Chapelle en Vercors - 880 m</i>	1 ^{er} tour	/	/
07	Paul BESSEAS <i>Quintenas - 400 m</i>	1 ^{er} tour	8,5 cm	45 kg
	GAEC La Ferme Commune <i>St Symphorien sous Ch. - 150 m</i>	Fin 1 ^{er} tour	5,7 cm	16 kg
	GAEC Elevage du Serre <i>Ribes - 550 m</i>	1 ^{er} tour	5,3 cm	10 kg
	EARL des Noisetiers <i>Coucouron - 1200 m</i>	Sortie prévue sous 15 jours	/	/

Semis de prairie au printemps

Les semis de prairie peuvent encore s'envisager en plaine jusqu'à début avril. En montagne, ils peuvent commencer pour les parcelles situées sous les 1000 m d'altitude.



Pour rappel, l'implantation printanière est très favorable au développement des légumineuses et est fortement recommandée pour les prairies à dominante de luzerne ou de trèfle. En cas de semis de légumineuses pures, il peut être pertinent d'y associer environ 30-40 kg d'avoine de printemps afin d'augmenter le rendement de la première coupe (fauche au début de l'épiaison de l'avoine). Cette technique réduit aussi fortement le salissement de la jeune prairie.

En plaine, on peut retenir en moyenne une croissance autour de 30 kg de MS/ha/jour. Ainsi, pour un troupeau de 60 vaches laitières pâturant sur 12 ha autour de la stabulation, on peut considérer : 12 ha x 30 kg = 360 kg de MS/jour, soit 6 kg de MS par vache laitière dans la ration.






Adice

Service - Conseil - Expertise

**Agir pour la réussite et le bien-être
des éleveurs de nos territoires**



Stations météo

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Bourgoin-Jallieu (358 m) | 7 La Chapelle-en-Vercors (879 m) | 12 Colombier-le-Jeune (566 m) |
| 2 St-Étienne-St-Geoirs (384 m) | 8 St-Christophe et le Laris (400 m) | 13 St-Agrève (1014 m) |
| 3 St-Laurent-du-Pont (410 m) | 9 Étoile-sur-Rhône (145 m) | 14 Issanlas (1264 m) |
| 4 Chatte (272 m) | 10 St-Sauveur-en-Diois (338 m) | 15 Aubenas-Lanas (265 m) |
| 5 Roissard (746 m) | 11 Annonay (336 m) | |
| 6 Villard-de-Lans (1027 m) | | |

Vos Conseillers d'élevage Adice



BOVIN

- Pierre GONIN** - Nord Isère
06 30 63 23 40
- Maëline CERDAN** - St Marcellin
06 22 73 85 11
- Laurine DELORT** - Chartreuse / Valdaine
06 71 00 37 07
- Chloé GRILLOT** - Terres Froides Ouest
06 71 00 36 98
- Clément DIVO** - Terres Froides Est
06 71 00 37 10
- Marie-Lou LORENZATO** - Vercors / Royans
06 25 41 19 58
- Yannick BLANC** - Nord Drôme
06 25 41 19 70
- Odile SEIVE** - Nord Ardèche
06 62 42 06 00
- Katleen PETIT** - Vallée du Rhône
06 62 42 08 16
- Jérémy CRESPI** - Plateaux Ardéchois
06 26 36 41 28
- Philippe CHABANAS** - Vernoux
06 62 42 06 93
- Margot ALLIX** - Sud Isère
06 71 00 37 18



CAPRIN / OVIN

- Benoit DESANLIS** - Isère
06 30 63 23 19
- Aude PASQUET** - Nord Drôme / Vercors
06 76 91 90 99
- Mathilde CHAZALET** - Sud Drôme
06 25 41 19 74
- Priscilia CROUZET** - Nord Ardèche
06 62 42 06 44
- Lucas CLAUZIER** - Sud Ardèche
06 62 42 08 99