L'ECHO DES CAMPAGNES N°15

>> Fourrages et pâturage

24 août 2026

Adice
Service - Conseil - Expertise

Le retour de la pluie

La pluie est enfin revenue sur notre région la semaine dernière tandis que les températures sont maintenant plus proches des normales. Cette semaine s'annonce orageuse, avec des **précipitations potentiellement importantes jeudi et vendredi**. Une influence océanique fraiche pourrait ensuite s'imposer pour le début du mois de septembre.

Récolte du maïs en épi et grain humide

Une grosse partie des ensilages de maïs en plante entière a déjà été effectuée sur notre région. **Le stade du maïs pour récolter de l'épi ou grain humide sera bientôt atteint**.

Pour le maïs-épi, 200°C cumulés supplémentaires sont nécessaires par rapport au stade 32% de MS de la plante entière pour déclencher la récolte, ce qui correspond à une plante entière autour de 40% de MS (soit 10-15 jours plus tard que le stade 32% de MS). À ce stade, la culture commence à changer de couleur et les épis se tournent vers le sol.

Pour le maïs grain humide, le plus simple est de réaliser des échantillons de grain et d'en tester l'humidité. Visez 32% d'humidité pour l'échantillon pris à la main afin de récolter un grain autour de 35% d'humidité.



Parcelle de maïs qui atteint le stade pour la récolte en épi.

Le grain doit être bien chargé en amidon, tout en présentant encore un peu de lait à la pointe du grain

Semis d'herbe

Les conditions météo redeviennent favorables à la croissance de l'herbe. Il est donc temps d'envisager le semis des futures prairies. Avant de semer, il convient de bien en **identifier les objectifs** (quelle exploitation ? quelle durée ?) et de bien **caractériser les parcelles à semer** (sol sec ou humide ? à tendance acide ou calcaire ?).

Durée d'implantation : RGI non-alternatif et trèfles annuels (incarnat, Micheli, Perse) pour les dérobées avant maïs et les prairies de 1-2 ans. RGH, brôme, trèfle violet et trèfle hybride pour les prairies de 2-3 ans. RGA, dactyle, fétuque élevée, fléole, trèfle blanc, lotier et luzerne pour des prairies de 3 ans et plus. Leur pérennité peut s'allonger si les conditions sont favorables.

Conditions pédoclimatiques : Dactyle, brome, luzerne et lotier sont particulièrement résistants à la sécheresse et aux températures élevées. En conditions humides, fétuque des prés, fléole et trèfle hybride conviennent tout à fait. En situations favorables, les ray-grass et les trèfles blancs et violets sont des espèces présentant les meilleures valeurs alimentaires mais elles sont sensibles aux températures élevées (sup. à 25-30°C).

Pâturage : RGA et trèfle blanc constituent la base des mélanges pour pâturage. Les variétés tétraploïdes sont plus riches en eau donc plus appétantes mais à éviter en fauche. Les variétés tardives sont souvent plus souples pour l'exploitation en pâturage (restent au stade feuillu plus longtemps). En situations plus difficiles ou séchantes, le dactyle et la fétuque élevée deviennent indispensables. Choisir des variétés de fétuque à feuille souple pour améliorer l'appétence. Dans ces situations, le lotier complète bien le trèfle blanc comme légumineuse de pâture.

Dans un contexte climatique dégradé, où les conditions météo peuvent passer facilement d'un extrême à l'autre, **la diversité des prairies est essentielle à la régularité de la production fourragère** des exploitations. Il est donc recommandé de **travailler en mélange** et d'en cultiver au moins deux types différents (une prairie à dominante de luzerne et une autre à dominante de graminées par exemple).

N'hésitez pas à solliciter votre conseiller afin d'affiner vos choix de semences et préparer le futur assolement fourrager 2027.

L'ECHO DES CAMPAGNES N°15

>> Fourrages et pâturage

24 août 2026

Adice
Service - Conseil - Expertise

Voici quelques propositions de mélanges d'herbe :

Dérobée avant maïs (coupe uniquement au printemps) :

RGI non alternatif 15 kg + vesce velue 10 kg

Prairie de fauche 18 mois - 2 ans :

RGI non alternatif / RGH 15 kg + trèfle violet 10 kg

Prairie de fauche 3-5 ans sur sol sain à dominante luzerne :

Luzerne 15 kg + RGH/RGA 6 kg + dactyle 3 kg + trèfle violet 3 kg

Prairie de fauche 3-5 ans sur sol frais à dominante graminées :

RGA/RGH 15 kg + dactyle 3 kg + fléole 3 kg + trèfle violet 3kg + trèfle blanc géant 3 kg

Pâture sur sol frais :

RGA 20 kg + fléole 3 kg + trèfle blanc 3 kg + trèfle violet 3 kg

Pâture sur sol plus séchant :

RGA 10 kg + fétuque élevée 10 kg + dactyle 3 kg + trèfle blanc 3 kg + lotier 3 kg

Fertilisation des dérobées estivales

Les dérobées estivales (moha et sorgho) semées après céréales sont maintenant bien en place et vont pouvoir valoriser les pluies du moment. La récolte s'effectue environ 60 jours après le semis, de fin-septembre à début octobre. **Une récolte avant épiaison est impérative si les fourrages sont destinés aux animaux en lactation**.

Si aucun apport d'effluent n'a été réalisé avant le semis et que la parcelle est cultivée en céréale depuis plusieurs années, un **léger apport d'engrais azoté avant les prochaines pluies sera bien valorisé par la culture**. Comptez environ 30 unités d'azote pour cet apport.

Poursuite du pâturage de sorgho

Dans les conditions particulièrement sèches et chaudes de l'été 2026, le pâturage du sorgho fourrager multi-coupe a été d'une grande aide, permettant de **maintenir du fourrage vert dans la ration des animaux**.

En attaquant le pâturage **45 jours après semis** et avec un **délai de retour de 30 jours**, les animaux sont actuellement dans le 2ème tour de pâturage. La pluie tombée et à venir devrait assurer un 3ème passage sur le mois de septembre.



Sorgho multi-coupe dans le 2ème tour de pâture des vaches laitières sur le secteur de St Marcellin (38). Le semis a été réalisé fin-mai après labour d'une prairie pâturée, avec l'objectif de la renouveler (invasion de rumex).

La parcelle est pâturée au fil de nuit, à raison de 3-4 kg de MS/vache/jour et les animaux sont complétés en ration mélangée le jour. Le 3ème tour devrait commencer d'ici 10-15 jours.

La consommation du sorgho à un stade relativement jeune (80-100 cm de haut) assure une qualité alimentaire et une appétence très élevée. Les refus sont très peu nombreux.

L'ECHO DES CAMPAGNES

>> Carte et contacts

CAPRIN / OVIN

Aude PASQUET - *Nord Drôme / Vercors*
06 76 91 90 99


Lise VERMOT-DESROCHES - *Nord Drôme-Ardèche*
06 25 32 80 35

Mathilde CHAZALET - *Sud Drôme*
06 25 41 19 74

Priscilia CROUZET - *Nord Ardèche*
06 62 42 06 44

Lucas CLAUZIER - *Sud Ardèche*
06 62 42 08 99

Benoit DESANLIS - *Isère*
06 30 63 23 19



BOVIN

Pierre GONIN - *Nord Isère*
06 30 63 23 40

Maëline CERDAN - *St Marcellin*
06 22 73 85 11

Laurine DELORT - *Chartreuse / Valdaine*
06 71 00 37 07

Chloé GRILLOT - *Terres Froides Ouest*
06 71 00 36 98

Clément DIVO - *Terres Froides Est*
06 71 00 37 10

Margot ALLIX - *Trièves / Vercors*
06 71 00 37 18

Jules VAN DER CRUYSSEN - *Matheysine*
06 25 32 00 70

Marie-Lou LORENZATO - *Vercors / Royans*
06 25 41 19 58

Yannick BLANC - *Nord Drôme*
06 25 41 19 70

Odile SEIVE - *Nord Ardèche*
06 62 42 06 00

Katleen PETIT - *Vallée du Rhône*
06 62 42 08 16

Jérémy CRESPY - *Plateaux Ardéchois*
06 26 36 41 28

Philippe CHABANAS - *Centre Ardèche*
06 62 42 06 93

Stations météo

1. Bourgoin-Jallieu (358 m)
2. St-Étienne-St-Geoirs (384 m)
3. St-Laurent-du-Pont (410 m)
4. Chatte (272 m)
5. Roissard (746 m)
6. Villard-de-Lans (1027 m)
7. La Chapelle-en-Vercors (879 m
8. St-Christophe et le Laris (400 m)
9. Valence - Chabeuil (145 m)
10. St-Sauveur-en-Diois (338 m)
11. Annonay (336 m)
12. Colombier-le-Jeune (566 m)
13. St-Agrève (1014 m)
14. Issanlas (1264 m)
15. Aubenas-Lanas (265 m)

Adice
Service - Conseil - Expertise

SUD RHÔNE ALPES

CENTRE-EST

Bulletin rédigé par Adice Conseil Élevage avec le soutien financier des Crédits Agricoles Sud-Rhône-Alpes et Centre-Est