

17 février
2025Somme de température depuis le 1^{er} janvier

Retrouvez ci-dessous les sommes de température depuis le 1^{er} janvier pour les différentes stations météo de notre région.

L'apport d'engrais azoté sur prairies et dérobées est recommandé lorsque les 200°C cumulés sont dépassés.



	Stations météo au 17 février 2025	Σ T°C depuis le 1 ^{er} janvier	Σ pluvio depuis le 1 ^{er} janvier
38	Bourgoin-Jallieu (358 m)	249 (+72)	111 (+9)
	St-Étienne-St-Geoirs (384 m)	243 (+74)	96 (+12)
	St-Laurent-du-Pont (410 m)	228 (+70)	189 (+14)
	Chatte (272 m)	275 (+91)	128 (+19)
	Roissard (746 m)	237 (+79)	119 (+16)
	Villard-de-Lans (1027 m)	188 (+63)	140 (+16)
26	Chapelle-en-Vercors (879 m)	222 (+71)	143 (+20)
	St-Christophe Laris (400 m)	234 (+68)	119 (+21)
	Étoile-sur-Rhône (145 m)	315 (+96)	116 (+35)
	St-Sauveur-en-Diois (338 m)	290 (+90)	129 (+28)
07	Annonay (336 m)	280 (+82)	72 (+28)
	Aubenas-Lanas (265 m)	316 (+96)	224 (+87)
	Colombier-le-Jeune (566 m)	219 (+60)	196 (+70)
	Issanlas-Peyrebeille (1264 m)	121 (+31)	153 (+69)
	St-Agrève (1014 m)	158 (+47)	153 (+65)

Entre parenthèses : évolution sur les 15 derniers jours

Bulletin rédigé par Adice Conseil Élevage
avec le soutien financier des Crédits
Agricoles Sud-Rhône-Alpes et Centre-Est



Agir pour la réussite et le bien-être des éleveurs de nos territoires

Le retour du soleil



Les conditions météo redeviennent enfin favorables aux travaux des champs depuis la fin de la semaine dernière. Un temps sec est annoncé pour toute cette semaine, avec toutefois des gelées matinales fréquentes en plaine. Le soleil, le vent et le gel favorisent le ressuyage des terres. **Une bonne occasion d'avancer les chantiers d'apports d'effluents sur les prairies !**

Fertilisation de l'herbe et des céréales

Les 200°C cumulés depuis le 1^{er} janvier sont dépassés sur tous les secteurs de plaine. Les apports d'azote minéral sur l'herbe et les céréales peuvent donc être déclenchés dans toutes ces zones.



Pensez bien à prendre en compte vos apports de lisiers et fumier qui sont souvent suffisants pour fertiliser les prairies temporaires et les dérobées en sortie d'hiver. En l'absence d'effluents, une fertilisation de 30 à 50 unités d'azote minéral est convenable pour ce premier tour sur l'herbe et les céréales.



RGI dérobé dans les Terres Froides (500 m d'altitude). La reprise de végétation est maintenant bien amorcée



Adice
Service - Conseil - Expertise

17 février
2025



Adice
Service - Conseil - Expertise

Pâturage de nettoyage en sortie d'hiver

Face au stock d'herbe présent en sortie d'hiver dans de nombreuses parcelles en plaine, **cette semaine ensoleillée est propice à une sortie des animaux sur une faible durée journalière** (3-4 heures max). Il est intéressant de faire déprimer aussi bien des parcelles de fauche que de pâturage avec un résidu hivernal important.



Les volumes d'herbe disponibles sont hétérogènes et la pousse n'est pas encore active partout. **Un passage rapide des animaux permettra aux zones très avancées d'être valorisées et nettoyées avant le réel démarrage de la saison de pâture.** En fin de semaine, un apport d'environ 30 unités d'azote minéral pourra être réalisé pour accélérer la croissance de l'herbe dans ces parcelles.



*L'objectif de ce passage de nettoyage est de faire **consommer les touffes de dactyle et de féтуque** tant qu'elles sont encore appétantes pour les animaux. Cela dégagera de la lumière pour le développement des autres espèces de meilleure valeur alimentaire (ray-grass, trèfles) et vous évitera d'être débordé trop rapidement par les refus au printemps*



Faites profiter vos animaux d'une **cure bien-être** par ce pâturage au soleil après un hiver bien gris : **vitamines, oligo-éléments, lavage des pieds**, etc. Ce passage à l'extérieur, même limité à quelques heures, sera **très favorable à leur santé !**

Préparation des terres à maïs

Le retour des conditions favorables permet de commencer les travaux pour les futures parcelles de maïs sans dérobées. **Profitez de la météo actuelle pour détruire les couverts d'interculture et apporter le fumier.**

Si une préparation sans labour est prévue, il ne faut pas trop tarder à réaliser le premier passage de cultivateur. Cela permettra d'incorporer la matière organique et de commencer à détruire les plantes en place, notamment les touffes de graminées.